

A associação entre o ibuprofeno, uma droga antiinflamatória não-esteroidal, com o hidrocodone, um analgésico opióide de ação central, apresenta grande eficácia no controle da dor pós-operatória em cirurgias periodontais

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Betancourt e cols., do Departamento de Especialidade Dentária da Clínica Mayo, em Rochester, EUA, avaliaram o efeito da associação da droga anti-inflamatória não-estereoidal Ibuprofeno com o opióide hidrocodone para o alívio da dor pós-operatória em pacientes submetidos a cirurgias periodontais. Participaram deste estudo pacientes que necessitavam de duas cirurgias periodontais em diferentes quadrantes. As cirurgias foram realizadas com intervalo de pelo menos 2 semanas e os procedimentos como anestesia e extensão da cirurgia foram padronizados. Como medicação para controle da dor pós-operatória, os pacientes receberam 400 mg de Ibuprofeno ou 400 mg de Ibuprofeno associado a 5 mg de hidrocodone, nos diferentes dias de intervenção cirúrgica. A avaliação do efeito analgésico foi realizada com o uso de escala visual analógica a cada 2 horas por 12 horas após a cirurgia. Os resultados mostraram que a associação ibuprofeno / hidrocodone foi bastante efetiva para controlar a dor pós-operatória, sem apresentar qualquer efeito colateral. Nota da redação: Alguns trabalhos têm procurado demonstrar a associação de diferentes drogas analgésicas para o controle da dor (Ver também DOL Ano 5 número 49). A vantagem destas

associações é que podem ser administradas doses menores de cada medicação, conseguindo-se efeitos analgésicos satisfatórios, com redução de efeitos colaterais.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/a-associacao-entre-o-ibuprofeno-uma-droga-antiinflamatoria-nao-esteroidal-com-o-hidrocodone-um-analgésico-opioide-de-acao-central-apresenta-grande-eficacia-no-controle-da-dor-pos-operatoria-em-cirurgi · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE