

A influência da angústia pré-cirúrgica na dor crônica pós-operatória em

cirurgia cardiotorácica A dor crônica pós-cirúrgica (DCPC) é definida como dor que persiste por mais de 3 meses após a cirurgia. Possui interferência significativa na qualidade de vida do paciente e é relatada em 28% dos casos de cirurgia c

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

cirurgia cardiotorácica A dor crônica pós-cirúrgica (DCPC) é definida como dor que persiste por mais de 3 meses após a cirurgia. Possui interferência significativa na qualidade de vida do paciente e é relatada em 28% dos casos de cirurgia cardíaca e em 60% dos casos de cirurgia torácica. Pesquisadores realizaram um estudo prospectivo longitudinal em um hospital de Toronto, no Canadá, buscando compreender se a angústia pré-operatória prediz a DCPC e incapacidade relacionada à dor no período de 6 meses após cirurgias cardiotorácicas não emergenciais. Os participantes da pesquisa deveriam ser maiores de 18 anos, falar inglês e não possuir histórico de transtornos psíquicos. A amostra foi de 543 participantes. Para avaliação, os participantes responderam a questionários antes da cirurgia e 3, 6 e 9 meses após. No questionário, havia dados sociodemográficos e escalas para aferição de sofrimento emocional, pensamento catastrófico, avaliação da depressão e ansiedade, intensidade e incapacidade da dor. Os achados incluíram que a idade está à intensidade da DCPC e o sofrimento pré-cirúrgico foi um fator determinante tanto para a intensidade quanto para a incapacidade da DCPC. Embora ainda não seja classificada como um risco causal para a intensidade e incapacidade da dor

crônica pós-cirúrgica, a avaliação da angústia pré-cirúrgica pode ser vantajosa a fim de avaliar o risco do desenvolvimento da dor e realizar intervenção precoce para esse problema. Referências: Aternali A, Slepian PM, Clarke H, Ladha KS, Katznelson R, McRae K, Seltzer Z, Katz J. Presurgical distress about bodily sensations predicts chronic postsurgical pain intensity and disability 6 months after cardiothoracic surgery. *Pain*. 2022 Jan 1;163(1):159-169. doi: 10.1097/j.pain.0000000000002325. PMID: 34086627. Alerta submetido em 17/01/2022 e aceito em 31/01/2022. Escrito por Rafaela Silva Motta.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/a-influencia-da-angustia-pre-cirurgica-na-dor-cronica-pos-operatoria-em · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE