

Abuso de opioides na gravidez e síndrome de abstinência em bebês

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Na última década, triplicou o número de recém-nascidos com síndrome de abstinência por substâncias derivadas do ópio. Um novo estudo, divulgado no *The Journal of the American Medical Association*, quantificou o crescimento do problema, bem como o aumento dos custos no tratamento desses recém-nascidos. Baseado em dados de mais de quatro mil hospitais, eles perceberam que grande parte do problema é devido ao vício em remédios para dor, entre eles oxicodona e codeína. Só em 2009, 13,5 mil bebês foram nascidos no país com síndrome de abstinência neonatal. A condição conhecida como síndrome de abstinência neonatal pode causar convulsões, problemas respiratórios, desidratação, dificuldade de alimentação, tremores e irritabilidade. Muitas crianças são hospitalizadas por várias semanas. Elas devem ser acalmadas com carinho e colocadas em quartos escuros. Se não houver êxito, os recém-nascidos recebem morfina, metadona ou outra droga relacionada com a que o bebê foi exposto no útero. Esse processo requer uma monitorização cuidadosa. Ainda não existe um estudo conclusivo sobre quais são os impactos em longo prazo para a saúde de bebês que nascem com sintomas de dependência, apesar de pesquisas apontarem para um risco mais alto de problemas no desenvolvimento. Entretanto, estes reagem bem durante as primeiras semanas de vida. O que tem de mais alarmante é o custo muito elevado com os bebês que nascem com o problema. Crianças do estudo gastaram uma média de 16 dias no hospital, comparado com apenas três para os demais bebês, geralmente em unidades neonatais de cuidados intensivos,

que são especialmente caras. Referência e fontes: Patrick SW, Schumacher RE, Benneyworth BD, Krans EE, McAllister JM, Davis MM. Neonatal abstinence syndrome and associated health care expenditures: United States, 2000-2009. JAMA. 2012 307(18):1934-40.

http://www.nytimes.com/2012/05/01/health/research/prescription-drug-abuse-soars-among-pregnant-women.html?_r=1&ref=americanmedicalassociation

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/05/120501_bebes_vicio_is.shtml

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/abuso-de-opioides-na-gravidez-e-sindrome-de-abstinencia-em-bebes · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE