

Acerca do tratamento farmacológico da artrite reumatoide, considera-se como

primeira linha de medicamento o metotrexato e em caso de falha ou toxicidade hepática e/ou gastrointestinal ao fármaco usar leflunomida, sulfassalazina ou hidroxicloroquinina, sendo a última pouco efetiva. Após uso de um destes medicamentos

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

primeira linha de medicamento o metotrexato e em caso de falha ou toxicidade hepática e/ou gastrointestinal ao fármaco usar leflunomida, sulfassalazina ou hidroxicloroquinina, sendo a última pouco efetiva. Após uso de um destes medicamentos, se ocorrer falha terapêutica opta-se pelos anti-TNF (certolizumabe pegol, adalimumabe, infliximabe, etanercepte e adalimumabe) e os não anti-TNF (abatcepte e tocilizumabe) em associação ao metotrexato, sendo esta a segunda linha de tratamento farmacológico. Se ocorrer falha terapêutica ou toxicidade ao medicamento de segunda linha deve ser utilizado esquema com outro medicamento dos de segunda linha ou a Tofacitinibe e se possível associar-se aos de primeira linha (preferencialmente metotrexato). Os glicocorticoides e os anti-inflamatórios não esteroidais podem ser utilizados para fase inicial da doença e controle sintomático da doença, porém devem ser utilizados em doses menores e em menor tempo. Além do tratamento farmacológico para a artrite reumatoide, deve-se orientar para mudanças de hábitos e o tratamento de comorbidades. O PCDT proposto visa auxiliar a identificação precoce e o tratamento adequado para a

artrite reumatoide, sendo estes dois pontos importantes para a redução da destruição articular. Com isso pode-se minimizar as consequências da doença como a incapacidade funcional, perda da produtiva e piora da qualidade de vida. Referência: Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC). Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Artrite Reumatóide: Relatório de Recomendação. Brasil: Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC); 2019.

Alerta submetido em 03/04/2019 e aceito em 03/04/2019.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/acerca-do-tratamento-farmacologico-da-artrite-reumatoide-considera-se-como · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE