

Acupuntura intradermal pré-operatória reduz a dor, a náusea e o vômito, a necessidade de analgésico e a resposta simpatoadrenal pós-operatória

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Entre os métodos potenciais para reduzir a dor pós-operatória está a acupuntura, a qual apresenta baixo custo e ausência de efeitos colaterais. A teoria tradicional chinesa indica uma série de “acupontos” chamados pontos associados à vísceras que reduzem a dor induzida por disfunção visceral. As agulhas são posicionadas no pré-operatório e mantidas por alguns dias no pós-operatório. Os resultados obtidos por Kotani e cols. do departamento de Anestesiologia da Universidade de Hirosaki, Japão, mostraram que pacientes submetidos a acupuntura pré-operatória apresentaram maior alívio da dor, redução de 50% no consumo de morfina, redução de 20 a 30% na incidência de náusea, redução de 30 a 50% na concentração plasmática de cortisol e epinefrina. Os autores concluem que a inserção intradermal de agulhas reduz a dor pós-operatória, diminui a necessidade de analgésicos, reduz os efeitos colaterais relacionados ao uso de opioides e reduz a ativação do sistema simpatoadrenal.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/acupuntura-intradermal-pre-operatoria-reduz-a-dor-a-nausea-e-o-vomito-a-necessidade-de-analgésico-e-a-resposta-simpatoadrenal-pos-operatoria · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.