

Administração intratecal de midazolam associado com fentanil produz efeito analgésico satisfatório em parturientes sem causar efeitos colaterais indesejáveis na mãe ou no feto, possibilitando a redução do uso de opióides

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Tucker e cols., do Departamento de Anestesia do Centro Médico da Universidade Monash, na Austrália, trataram 30 parturientes por via intratecal com 10mg de fentanil (poderoso analgésico opióide) associado à 2mg de midazolam (tranquilizante benzodiazepínico hidrossolúvel) para o alívio da dor do parto. O índice de dor foi avaliado por uma escala numérica de 0 a 10, na qual o valor 0 significa “sem dor” e, o valor 10, a “pior dor já sentida”. Foram monitorados também os batimentos cardíacos fetais e a pressão arterial, frequência respiratória, náusea, dor de cabeça e nível de sedação da mãe. Os resultados deste estudo sugerem que o uso de midazolam potencia o efeito analgésico da administração de fentanil, sem produzir efeitos colaterais indesejáveis na mãe ou no feto. Nota da redação: Ainda há certo dilema quanto ao uso da administração intratecal de midazolam, isto porque são poucos os estudos em animais experimentais que avaliam esta via de administração, a sua eficácia, bem como a toxicidade e a estabilidade da diluição do midazolam utilizado. Para saber mais veja também: Anesthesia & Analgesia 98 (6): 1507-1508, 2004; Anesthesia & Analgesia 98 (6): 1509-1511, 2004; Anesthesia & Analgesia 98 (6): 1528-1535,

2004. Referência: Anesthesia & Analgesia 98 (6): 1521-1527, 2004.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/administracao-intratecal-de-midazolam-associado-com-fentanil-produz-efeito-analgésico-satisfatório-em-parturientes-sem-causar-efeitos-colaterais-indesejáveis-na-mãe-ou-no-feto-possibilitando-a-redução · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE