

Alívio da dor crônica e espontânea através da injeção endovenosa de lidocaína

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O uso intravenoso de lidocaína tem sido preconizado para tratamento de dor crônica em muitas situações. Attal e cols. realizaram estudo duplo-cego em dois grupos de pacientes que utilizaram ou não a lidocaína, com posterior uso de mexiletina (bloqueador de canal de sódio). O uso de mexiletina diminuiu a alodinia dinâmica e alodinia / hiperalgesia estática mecânica, mas não a alodinia térmica e a hiperalgesia. Os efeitos da lidocaína e mexiletina na dor espontânea foram significativamente maiores em pacientes com alodinia mecânica concomitante quando comparados com outros sem alodinia. Estes dados indicam efeito anti-hiperalgésico da lidocaína intravenosa em pacientes com lesão nervosa periférica e portadores de modalidade específica de alodinia. A alodinia mecânica poderia ser tratada com drogas do tipo anestésico local e possivelmente com outros bloqueadores de canal de sódio. Referência: Neurology. 2004 Jan 27;62(2):218-25

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/alivio-da-dor-cronica-e-espontanea-atraves-da-injecao-endovenosa-de-lidocaina · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.