

Alívio da dor no pós-operatória gastrointestinal superior

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Em 2012, no Hospital Broomfield do Reino Unido foi realizada uma auditoria retrospectiva para o alívio da dor pós-operatória em pacientes que haviam sido submetidos a operações gastrointestinais de câncer no estômago e esôfago. Sendo avaliados os casos, os cuidados, gráficos e tabelas de medicamentos para o alívio da dor dos pacientes. O principal método de alívio da dor foi analgesia peridural torácica em 95%, analgesia peridural torácica com a combinação de analgesia vertebral em 2%, analgesia controlada pelo paciente e Trans abdominal simples utilizado em 3% dos pacientes. Um total de 77% dos pacientes teve combinação com analgésicos simples, tais como o paracetamol. Entre os pacientes que tiveram a analgesia epidural, 68% teve analgesia peridural torácica por mais de 4 dias com alívio da dor. O método mais eficaz para o alívio da dor em operações gastrointestinais superiores foi a analgesia peridural torácica, no entanto 30% dos pacientes tiveram uma remoção prematura dos cateteres por complicações. Referência: S. R. Thanthulage, S. Liyanage, A. B. Jayawardena, V. Jayanthi, C. B. Tang, S. Kadiramanathan. Post-Operative Pain Relief In Major Upper Gastrointestinal Operations. Poster number: [PW029]. 15 WCP, Buenos Aires, Outubro de 2014.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/alivio-da-dor-no-pos-operatoria-gastrointestinal-superior · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.