

Analgesia no pós-operatório da mastectomia

Um estudo clínico realizado no Instituto do Câncer do Ceará mostrou que o uso isolado ou combinado da pregabalina e do sulfato de magnésio é eficaz na analgesia pós-operatória de retirada total da mama e linfonodos adjacentes. O estudo foi

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo clínico realizado no Instituto do Câncer do Ceará mostrou que o uso isolado ou combinado da pregabalina e do sulfato de magnésio é eficaz na analgesia pós-operatória de retirada total da mama e linfonodos adjacentes. O estudo foi realizado de março de 2015 a novembro de 2017 com pacientes submetidas a essa cirurgia. Verificou-se também a ocorrência de possíveis efeitos adversos relacionados aos medicamentos, assim como possível associação de transtornos psicoemocionais (ansiedade, depressão) com a intensidade da dor relatada pelas pacientes do estudo. Participaram do estudo 80 mulheres divididas aleatoriamente em quatro grupos: pregabalina e sulfato de magnésio; pregabalina e placebo; sulfato de magnésio e placebo; e o último recebeu placebo. É importante mencionar que foi assegurada anestesia e analgesia adequadas a todas as participantes, independente do grupo de alocação. As pacientes foram monitorizadas 1, 12 e 24 horas após a cirurgia através de anamnese, medida de intensidade de dor, evolução dos sintomas algícos, necessidade de utilização de opioides, presença ou ausência de náusea e vômito e sonolência. O estudo demonstrou que, na primeira hora, a associação de pregabalina e o sulfato de magnésio foi eficaz na analgesia, porém o uso isolado dos mesmos não foi eficaz. Em 12 horas após a cirurgia, a associação dos medicamentos continuou tendo

eficácia, mas, isoladamente, apenas a pregabalina promoveu analgesia satisfatória. Em 24 horas, o uso isolado de ambos foi semelhantemente eficaz para a analgesia. Ademais, os efeitos adversos não tiveram aumento em sua frequência com o uso da associação e os níveis de ansiedade ou depressão não interferiram na intensidade da dor. Referência: ARAUJO, José Nilson Fortaleza de; LIMA, Marcos Venício Alves; NAKAMURA, Giane. Efeito analgésico da pregabalina e do sulfato de magnésio no pós-operatório de mastectomia com linfadenectomia axilar. Brjp [online], São Paulo, 5(1): 14-9, jan-mar. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/brjp/a/GzB6w7vpghwHYjkS6g8W5mw/?format=pdf&lang=pt> Alerta submetido em 05/12/2022 e aceito em 07/02/2023. Escrito por Amanda Freires Guimarães Corrêa e Franciely Chaves Moura.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/analgesia-no-pos-operatorio-da-mastectomia · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.