

Antiinflamatórios não-esteroidais inibidores seletivos da COX-2 podem ser mais perigosos do que se imaginava: estudo canadense sugere que seu uso por pequenos períodos também aumenta o risco de ocorrência de problemas cardiovasculares

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Em concordância com nossa posição crítica sobre o uso dos medicamentos anti-inflamatórios não-esteroidais inibidores seletivos da enzima ciclooxigenase-2 (COX-2), um estudo publicado no jornal da Associação Médica Canadense (Canadian Medical Association Journal - CMAJ) indicou que esses medicamentos podem ser mais perigosos do que se imagina. Os responsáveis pelo estudo examinaram a base de dados de saúde da cidade de Quebec e avaliaram o tempo de uso de inibidores seletivos para a COX-2, relacionando este tempo ao risco de infarto do miocárdio em pacientes idosos (com mais de 66 anos) que nunca haviam sofrido infarto. Interessantemente, foi observado que o risco de infarto nos pacientes aumentou logo nas duas primeiras semanas de uso do rofecoxib, mantendo-se constante ou diminuindo levemente com o passar do tempo. Portanto, ao contrário do que se imaginava, o risco de problemas cardiovasculares pode não estar associado apenas ao uso prolongado dos anti-inflamatórios seletivos para COX-2, mas, também, ao seu uso durante pequenos períodos. (CMCL) Autores e procedência: Lévesque, LE, Brophy, JM, Zhang, B. - From the Department of Epidemiology and Biostatistics (Lévesque, Brophy,

Zhang) and the Department of Medicine, McGill University Health Centre (Brophy), McGill University, Montréal, Que., and the Department of Community Health and Epidemiology, Queen's University, and Kingston, Frontenac, Lennox and Addington Public Health, Kingston, Ont. (Lévesque); Nota da redação: Veja editorial sobre o panorama atual do uso de inibidores seletivos para COX-2 após a retirada do Vioxx® do mercado em nossa edição anterior (BAU DO DOL, Edição de Abril de 2006 - Ano 6 - Número 69, "Os inibidores seletivos de COX-2 após a proibição das vendas do Vioxx®"). Referência: Time variations in the risk of myocardial infarction among elderly users of COX-2 inhibitors. CMAJ. (2006) 174(11): online1-8.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/antiinflamatorios-nao-esteroidais-inibidores-seletivos-da-cox-2-podem-ser-mais-perigosos-do-que-se-imaginava-estudo-canadense-sugere-que-seu-uso-por-pequenos-periodos-tambem-aumenta-o-risco-de-ocorrencia · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.