

Antiinflamatórios não-esteroidais podem causar hipertensão no período pos-parto

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O Australian Adverse Drug Reactions Bulletin publicou matéria na qual um comitê que analisa casos envolvendo reações a drogas novas no mercado, interações medicamentosas e outras informações relacionadas a medicamentos, apresentou uma série de relatos de crises hipertensivas em mulheres que utilizaram anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs) após terem dado à luz. Entre os AINEs relatados estão indometacina, ibuprofeno e diclofenaco. Embora a eficácia dos AINEs no tratamento da dor pós-parto normal tenha sido demonstrada por vários estudos prospectivos, o uso destes medicamentos neste período em mulheres com história de eclâmpsia e em partos prematuros não foi analisado. A reportagem salienta, ainda, que os AINEs possuem efeitos mínimos sobre a pressão em indivíduos normotensos, mas podem causar aumento na pressão em pacientes hipertensos que controlam a pressão sanguínea com beta-bloqueadores ou inibidores da enzima conversora de angiotensina. Alguns estudos apresentados na reportagem sugerem que os AINEs podem causar aumento de pressão sanguínea em pacientes não controlados e este efeito seria em diferentes graus de intensidade dependendo do AINE utilizado.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/antiinflamatorios-nao-esteroidais-podem-causar-hipertensao-no-periodo-pos-parto · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.