

Bebês submetidos a experiências dolorosas exibem antecipadamente comportamentos de dor e hiperalgesia

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores canadenses revelaram que recém-nascidos expostos a testes invasivos dolorosos podem aprender antecipadamente a exibir comportamentos de dor e hiperalgesia. O estudo envolveu 42 recém nascidos, sendo 50% bebês de mães com diabetes (tipo 1, 2 ou gestacional), os quais são submetidos a testes de controle da glicemia logo após o nascimento via pequenas punções na pele acima do calcanhar. Todos os 42 bebês foram submetidos à punção venosa 24 horas após o nascimento e os pesquisadores observaram que os bebês das mães diabéticas, submetidos anteriormente aos testes de glicemia, exibiram comportamentos de dor ao simples procedimento de limpeza do local a ser puncionado. Portanto, um melhor manejo da dor dos recém nascidos submetidos a procedimentos dolorosos poderia evitar o desenvolvimento de respostas exacerbadas.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/bebes-submetidos-a-experiencias-dolorosas-exibem-antecipadamente-comportamentos-de-dor-e-hiperalgesia · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.