

## Cefaleia e atividade sexual

---

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

---

Cefaleia é frequente motivo para se evitar atividade sexual. Há casos, no entanto, em que a cefaleia ocorre em associação com a atividade sexual, sendo denominada clinicamente de cefaleia sexual ou coital. Stefan Evers e cols., da Universidade de Munster, Alemanha, avaliaram as alterações hemodinâmicas cerebrais associadas à atividade sexual em 12 pacientes portadores de cefaleia sexual do tipo explosiva. Estes pacientes, durante exercício ergométrico, tiveram aumento da pressão arterial significativamente maior do que em não portadores ou portadores de enxaqueca não relacionada com atividade sexual. No entanto, os três grupos experimentais não foram diferentes quanto à velocidade do fluxo arterial cerebral e à pulsação. Os resultados do estudo indicam que a cefaleia sexual não está associada a componentes miogênicos indutores de cefaleia. Referência: Pain, 102:73-78, 2003.

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/cefaleia-e-atividade-sexual](http://novo.dol.inf.br/materia/cefaleia-e-atividade-sexual) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.