

Cefaléia em salvas sem dor

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A cefaleia em salvas ("cluster headache") é caracterizada por fortes crises de cefaleia estritamente unilateral, orbitária e/ou temporal, durando 15-180 minutos. Pode ocorrer sudorese da fronte e da face, congestão nasal, lacrimejamento, miose, ptose e edema palpebral. As crises ocorrem de maneira seriada e duram de semanas a meses (os chamados "períodos de salvas"), separados por períodos de remissão durante meses ou anos. O pesquisador Rolf Salvesen, da Universidade de Troms, na Noruega, descreveu um caso incomum de cefaleia em salvas sem dor na edição de agosto do *Neurology*. Curiosamente, o paciente de 22 anos relatou todos os sintomas característicos da cefaleia em salvas, exceto a dor. Este foi o primeiro caso deste tipo de cefaleia sem dor já publicado. Em estudo prévio, foi proposto que a dor e os sintomas autonômicos da cefaleia em salvas podem ser gerados independentemente e o paciente apresentar os sintomas do lado contralateral àquele onde a dor se origina. O caso apresentado sugere fortemente que os sintomas autonômicos podem ser primários e não secundários à dor.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/cefaleia-em-salvas-sem-dor · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.