

Cetoprofeno: uma alternativa para o tratamento da enxaqueca aguda

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O tratamento agudo da enxaqueca pode ser realizado, em alguns casos, com o uso de anti-inflamatórios não-esteroidais. Assim, um estudo realizado por Dib e cols., do Serviço de Neurologia do Hospital Lariboisiere de Paris (França), testou a eficácia da administração oral do cetoprofeno no tratamento agudo da enxaqueca. Neste estudo, os pacientes receberam diferentes tratamentos para crises agudas consecutivas de enxaqueca, sendo eles: cetoprofeno nas doses de 75 e 150 mg, placebo (controle) e zolmitriptan (agonista de receptores de serotonina, muito eficaz no alívio da dor de pacientes com enxaqueca) na dose de 2,5 mg. Os tratamentos foram realizados em sequência aleatória e avaliou-se qual medicação foi mais efetiva em causar redução (severa, moderada, leve ou ausente) da enxaqueca em um período de 2 horas. Após esta análise, os autores observaram que o cetoprofeno, nas duas doses administradas, promoveu diminuição similar à produzida pela administração do zolmitriptan, sendo que a administração de placebo não diminuiu o índice de severidade da enxaqueca no período de 2 horas. Além disso, a tolerância ao cetoprofeno foi boa, semelhante ao uso do placebo. Estes resultados indicam que o uso do cetoprofeno oral pode ser uma alternativa para o tratamento da enxaqueca aguda.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/cetoprofeno-uma-alternativa-para-o-tratamento-da-enxaqueca-aguda · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.