

Consumo excessivo de acetaminofeno pode causar intoxicação hepática

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo realizado nos Estados Unidos demonstra que muitos americanos estão tendo problemas hepáticos por consumirem doses tóxicas de acetaminofeno, presente nos medicamentos Acetofen®, Dôrico®, Parador®, Tylenol®, Paracetamol®, Algidanilon®, Algifen®, etc.. Além dos avisos para que não ocorra a ingestão do medicamento após o consumo de bebidas alcoólicas devido ao risco de intoxicação hepática, outra preocupação está em voga, a superdosagem. Devido ao fato de acetaminofeno não necessitar de receita médica, a superdosagem e a mistura de vários medicamentos contendo acetaminofeno tornaram-se comum entre os norte americanos. Há controvérsias sobre a colocação de avisos explícitos da possível intoxicação hepática nas embalagens, pois como já ocorrido na Inglaterra, isto atrairia suicidas em potencial. A toxicidade hepática do acetaminofeno pode ser combatida se detectada no início porém, o diagnóstico pode ser difícil, já que os sintomas assemelham-se aos de uma gripe.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/consumo-excessivo-de-acetaminofeno-pode-causar-intoxicacao-hepatica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.