

## **Contribuição de receptores vanilóides para a nocicepção manifesta induzida pela ativação**

*de receptores B2 Os trabalhos que avaliam a participação de receptores vanilóides na nocicepção em geral utilizam testes térmicos. Neste estudo é avaliado um comportamento (tempo de lambida na pata) induzido pela aplicação de um estímulo n*

---

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

---

de receptores B2

Os trabalhos que avaliam a participação de receptores vanilóides na nocicepção em geral utilizam testes térmicos. Neste estudo é avaliado um comportamento (tempo de lambida na pata) induzido pela aplicação de um estímulo nociceptivo (bradicinina). Assim, foi detectada a participação dos receptores VR1, de metabólitos do ácido araquidônico, principalmente os derivados da 5-lipoxigenase, e a ativação de proteinoquinase C, no processo nociceptivo. Referência: Br] Pharmacol. 2004 Mar;141(5):787-94

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/contribuicao-de-receptores-vaniloides-para-a-nocicepcao-manifesta-induzida-pela-ativacao](http://novo.dol.inf.br/materia/contribuicao-de-receptores-vaniloides-para-a-nocicepcao-manifesta-induzida-pela-ativacao) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.