

Controle da dor de longa duração na neuralgia trigeminal com anestésicos locais utilizando-se um catéter no nervo mandibular

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Os autores relatam o caso de uma paciente, de 78 anos, com neuralgia do trigêmeo irresponsiva à carbamazepina e com dor incontrolável. Foi inserido um catéter para aplicação de anestésicos locais no nervo mandibular. Analisou-se a eficácia do bloqueio contínuo em três períodos de acordo com as diferenças na posição do catéter e no protocolo utilizado para injetar as drogas. Também foram avaliados, utilizando-se a escala analógica visual, dados sobre a qualidade, intensidade e localização da dor. O tratamento foi efetivo no controle da neuralgia. Pelo fato deste procedimento ser reversível e ter poucos efeitos tóxicos, poderá ser utilizado como mais um recurso terapêutico, principalmente naqueles pacientes com indicação para cirurgia de descompressão vascular.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/controle-da-dor-de-longa-duracao-na-neuralgia-trigeminal-com-anestesicos-locais-utilizando-se-um-cateter-no-nervo-mandibular · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.