

Controle de náusea/vômito causado pelo uso epidural de opióides

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Martin Mok e cols., do Hospital Universitário de Taipei (Taiwan), avaliaram a ocorrência de episódios de náusea/vômito em 80 parturientes selecionadas para parto cesariana. Segundo os autores, o uso epidural de soro fisiológico contendo opioide e droperidol (0,125 mg/ml) em sistema PCA (Patient-Controlled Analgesia) reduziu significativamente a ocorrência de náusea/vômitos induzidos pelo uso epidural de morfina nas primeiras 24 h do período pós-operatório. Gulden Ugur e cols., da Faculdade de Medicina da Universidade de Ege (Izmir, Turquia), relataram estudo indicativo de que o uso profilático de metoclopramida (10 mg, i.v.) em pacientes submetidos à cirurgia urológica extensa, preveniu a ocorrência de náusea/vômitos induzidos pelo uso epidural de tramadol em sistema PCA. Referência: Abstracts - 10th World Congress of Pain® - Painei: 620-P254

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/controle-de-nausea-vomito-causado-pelo-uso-epidural-de-opioides · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.