

## **Controle glicêmico pode ajudar no diagnóstico e avaliação de casos de dores neuropáticas**

---

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

---

Está bem documentado que a dor neuropática resulta de danos nos nervos que transmitem sinais de dor, fazendo com que esses nervos enviem sinais incorretos e desnecessários, levando à dor constante e, muitas vezes, agonizante. Alguns casos, inclusive, são relacionados a doenças metabólicas, como, por exemplo, a diabetes, que podem levar a alterações neuronais. Normalmente, o tratamento necessita de avaliações feitas por neurologistas e endocrinologistas. Um estudo-piloto envolveu 61 pacientes (41 homens e 20 mulheres) que foram convidados a preencher escalas informativas quantitativas e qualitativas sobre a dor que sentiam. Foram levados em conta vários critérios como sexo, idade e histórico de diabetes mellitus. Por meio deste estudo, os pesquisadores concluíram que estas avaliações ajudam a caracterizar melhor a dor neuropática e devem ser acompanhadas de rigoroso controle glicêmico. Autores e procedência do trabalho: K. Petrikonis - Neurology, Kaunas University of Medicine, Kaunas, Lithuania; Título do estudo: Prevalence and patterns of pain in diabetic neuropathy.

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/controle-glicemico-pode-ajudar-no-diagnostico-e-avaliacao-de-casos-de-dores-neuropaticas](http://novo.dol.inf.br/materia/controle-glicemico-pode-ajudar-no-diagnostico-e-avaliacao-de-casos-de-dores-neuropaticas) ·  
Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.