

Diclofenaco tópico: opção segura e eficaz para o tratamento de dores

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Diclofenaco tópico tem sido empregado para o controle de diversas dores, como as provenientes de osteoartrites e de lesões musculoesqueléticas. Recentemente, estudo clínico publicado na revista *Pain* mostrou que os pacientes com osteoartrite sintomática primária, quando tratada com diclofenaco tópico em uma solução contendo di-metil-sulfóxido (DMSO), apresentavam menos efeitos adversos e tinham uma melhora da dor e função comparável com os pacientes tratados com diclofenaco por via oral. A melhora da sintomatologia dos pacientes tratados com diclofenaco tópico foi duradoura, não sendo atribuída ao DMSO. Portanto, o tratamento com diclofenaco tópico formulado com DMSO parece ser bastante viável para o alívio dos sintomas associados com osteoartrite. Referência: Simon LS, Grierson LM, Naseer Z, Bookman AA, Zev Shainhouse J. Efficacy and safety of topical diclofenac containing dimethyl sulfoxide (DMSO) compared with those of topical placebo, DMSO vehicle and oral diclofenac for knee osteoarthritis. *Pain*. 2009 143(3):238-45.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/diclofenaco-topico-opcao-segura-e-eficaz-para-o-tratamento-de-dores · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.