

Dor crônica nos cuidados primários de HIV

A combinação de antirretrovirais tem proporcionado aos pacientes com HIV uma maior sobrevida, evidenciando que esta doença crônica que necessita de uma abordagem médica de equipe para fins de se obter uma redução na morbidade e mortalidade.

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A combinação de antirretrovirais tem proporcionado aos pacientes com HIV uma maior sobrevida, evidenciando que esta doença crônica que necessita de uma abordagem médica de equipe para fins de se obter uma redução na morbidade e mortalidade.

Visando essa redução na morbidade e observando o aumento de diagnósticos de dor crônica em pacientes com HIV, nota-se a necessidade de se ter um serviço de saúde relacionado à dor, já que este ainda não foi integrado aos cuidados primários. Neste sentido, foi realizado um estudo com o objetivo de caracterizar a dor crônica e os serviços de saúde relacionados a ela. Os resultados definem patologias degenerativas músculo-esqueléticas como as mais prevalentes, descrevem o contexto biopsicosocial em que ocorrem e demonstra a associação com os recursos de cuidados de saúde quando eles ocorrem.

Estes resultados apoiariam e orientariam a inclusão de serviços de gestão de dor como parte do modelo abrangente de cuidados ao HIV.

Essa integração poderia reduzir os custos com internações, emergências, radiologias, e diversos outros serviços hospitalares.

Referência: Jocelyn M. Jiao, Eric So, Jebakaran Jebakumar, Mary Catherine George, David M. Simpson, Jessica Robinson-Papp. Chronic pain disorders in HIV

primary care: clinical characteristics and association with healthcare utilization.
Pain. 2016, 157, p. 931-937

Alerta submetido em 05/04/2016 e aceito em 05/04/2016.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/dor-cronica-nos-cuidados-primarios-de-hiv · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE