

Dor de cabeça ao ingerir bebidas geladas

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores da Universidade de Harvard nos Estados Unidos e pela Universidade da Irlanda em Galway estudaram porque as pessoas apresentam dores de cabeça súbitas ao ingerirem bebidas geladas ou mesmo sorvetes. Com o auxílio da ressonância nuclear magnética funcional, os autores descreveram que quando a pessoa ingere uma bebida gelada ocorre uma rápida vasodilatação de uma artéria cerebral ao mesmo tempo em que relatavam uma experiência dolorosa na região das têmporas. À medida que a dor dissipava, o fluxo sanguíneo voltava ao normal. A ideia dos autores é que o aumento na vasodilatação poderia promover um aumento na pressão intracraniana e consequentemente causar a dor. Os autores acreditam que este evento também possa estar envolvido na geração de outros tipos de dor, como em casos de enxaqueca. Referência: Blatt MM, Falvo M, Jasien j, Deegan B, Laighin GÓ, Serrador J. Cerebral Vascular Blood Flow Changes During 'Brain Freeze'. FASEB J. April 2012 26 (Meeting Abstract Supplement) 685.4

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/dor-de-cabeca-ao-ingerir-bebidas-geladas · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.