

Dor do parto: um fantasma para muitas mulheres

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Há muitos anos os antidepressivos têm sido estudados e usados no lugar de analgésicos, sendo eficazes em muitos casos, principalmente na dor neuropática. Uma das classes de antidepressivos mais usados para alívio da dor é a dos tricíclicos (ATC). Cientistas da Holanda publicaram um estudo prospectivo que consistiu na análise médica de 14.784 escoceses, participantes da Pesquisa de Saúde Escocesa, sem histórico conhecido de doenças cardiovasculares (DCV). Cerca de 2% destes pacientes utilizaram ATCs. Durante o estudo (que durou aproximadamente 8 anos), houve 1434 eventos de DCV, 26,2% destes fatais. Os autores mostraram que os pacientes que utilizam ATC têm 35% mais propensão para DCVs que pacientes que não os utilizam. Anteriormente, já havia estudo mostrando que o uso dos ATC aumentava o risco relativo para infarto do miocárdio em aproximadamente duas vezes, se comparados com os pacientes que não utilizavam antidepressivos. Como todo estudo, este também teve suas limitações, os quais podem prejudicar as análises: falta de informações sobre a adesão ao tratamento e sobre a dose ingerida do medicamento. No entanto, a mensagem principal deste estudo é que a classe médica avalie cuidadosamente o uso de antidepressivos tricíclicos em pacientes propensos a doenças cardiovasculares, bem como seus conhecidos efeitos colaterais. Fontes: <http://www.fpabramo.org.br/galeria/gravidez-filhos-e-violencia-institucional-no-parto> <http://www.fpa.org.br/sites/default/files/cap4a.pdf>

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/dor-do-parto-um-fantasma-para-muitas-mulheres · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.