

Dor intensa em veteranos militares

Este estudo fornece estimativas nacionais da prevalência de veteranos militares dos Estados Unidos com dor severa, e compara veteranos com não veteranos da mesma idade e sexo. Os dados utilizados são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2010 a

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Este estudo fornece estimativas nacionais da prevalência de veteranos militares dos Estados Unidos com dor severa, e compara veteranos com não veteranos da mesma idade e sexo. Os dados utilizados são da Pesquisa Nacional de Saúde de 2010 a 2014 com 67.696 adultos que completaram o Suplemento de Funcionamento e Deficiência de Adultos. Os participantes com dor intensa foram identificados utilizando um sistema validado de codificação da gravidade da dor. Estima-se que 65,5% dos veteranos militares dos EUA relataram dor nos últimos três meses, com 9,1% classificados como tendo dor intensa. Em comparação com os veteranos, uma relação menor de não veteranos relataram dor (56,4%) ou dor intensa (6,4%). Considerando que os veteranos com idades entre 18 e 39 anos apresentaram taxas de prevalência significativamente maiores de dor intensa (7,8%) do que os não veteranos de idade semelhante (3,2%), os veteranos com idade igual ou superior a 70 anos apresentaram menor probabilidade de apresentar dor severa (7,1%) do que não veteranos (9,6%). Os veteranos do sexo masculino (9,0%) apresentaram maior probabilidade de apresentar dor intensa do que os não veteranos também do sexo masculino (4,7%). Entretanto, não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos femininos. A prevalência de dor intensa foi significativamente maior nos veteranos com dor

lombar (21,6%), dor na mandíbula (37,5%), dores de cabeça severas ou enxaqueca (26,4%) e dor no pescoço (27,7%) que nos não veteranos com essas condições (respectivamente: 16,7%, 22,9%, 15,9% e 21,4%). Embora os veteranos (43,6%) tivessem maior probabilidade de apresentar dores nas articulações do que os não veteranos

(31,5%), não houve diferença na prevalência de dor grave associada a essa condição.

Referência: Nahin RL. Severe Pain in Veterans: The Effect of Age and Sex, and Comparisons With the General Population. J Pain. 2017, 18(3):247-254.

Alerta submetido em 06/03/2017 e aceito em 07/03/2017.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/dor-intensa-em-veteranos-militares · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.