

## **Droga para controlar colesterol eleva risco de neuropatias**

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

As estatinas, drogas que reduzem o colesterol, podem aumentar o risco de neuropatia (dano nos tecidos neurais), sugerem pesquisadores da Dinamarca. A neuropatia periférica ocorre quando os nervos do sistema nervoso periférico são danificados. Os sintomas variam muito, mas podem incluir tremores, perda de sensibilidade e dores semelhantes a queimação, além de redução da sensibilidade à temperatura ou à dor. Em um estudo populacional realizado em uma região da Dinamarca, os pesquisadores identificaram 136 casos de neuropatia registrados pela primeira vez, sem causa aparente. Os casos foram divididos em definitivos, prováveis e possíveis, de acordo com o nível de certeza que os pesquisadores tinham a respeito da possibilidade de o dano ter sido causado por algum outro distúrbio. No total, nove pacientes tomavam estatinas em um tratamento que já durava cerca de três anos. Em comparação com um grupo-controle, formado por pessoas sem neuropatia, quem tomava os medicamentos foi de 4 a 14 vezes mais propenso a desenvolver polineuropatia sem causa conhecida, segundo artigo publicado na edição de 14 de maio da revista *Neurology*. No entanto, os autores concluíram que estes resultados não devem desestimular o uso desses medicamentos para reduzir o colesterol, pois os efeitos positivos proporcionados pelas estatinas, principalmente a redução do risco de doença cardíaca, superam o perigo potencial de neuropatia. Entretanto, se uma pessoa que usa o medicamento desenvolver sintomas de neuropatia, ela deve conversar com o médico, que pode reconsiderar o uso dessas drogas.

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/droga-para-controlar-colesterol-eleva-risco-de-neuropatias](http://novo.dol.inf.br/materia/droga-para-controlar-colesterol-eleva-risco-de-neuropatias) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL · DOR ON LINE