

Efeito analgésico do álcool

O consumo do álcool em indivíduos com dor crônica e também a possível diminuição do risco de artrite reumatoide no consumo moderado dessas bebidas tem sido relatados em diversos estudos já mostrados em nossos Boletins anteriores (Alimentos

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O consumo do álcool em indivíduos com dor crônica e também a possível diminuição do risco de artrite reumatoide no consumo moderado dessas bebidas tem sido relatados em diversos estudos já mostrados em nossos Boletins anteriores (Alimentos que aliviam as dores e Alcool e artrite reumatoide, Boletim: 160 Ano: 14). Além disso, na Edição de Abril de 2017 - Ano 17 - Número 201 (Modelo de dor crônica em animais induz aumento no consumo de álcool) foi apresentado um trabalho do modelo experimental com camundongos que pode ser usado por outros estudos na investigação dos mecanismos de consumo de álcool induzido pela dor crônica.

Recentemente, através de meta-análise, pesquisadores do Reino Unido visaram esclarecer se o álcool produz uma diminuição na dor induzida experimentalmente e determinaram a magnitude de tal efeito. As descobertas sugerem que o álcool é um analgésico eficaz com reduções relevantes na avaliação da intensidade da dor, o que poderia explicar o uso indevido de álcool naqueles com dor persistente, apesar das suas potenciais consequências para a saúde em longo prazo. Pesquisas adicionais são necessárias para corroborar esses achados em estados de dor clínica. Referência: Thompson T, Oram C, Correll CU, Tsermentseli S, Stubbs B. Analgesic Effects of Alcohol: A Systematic Review and Meta-Analysis of

Controlled Experimental Studies in Healthy Participants. J Pain. 2017, 18(5):499-510.

Alerta submetido em 04/05/2017 e aceito em 09/05/2017.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/efeito-analgésico-do-alcool · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL · DOR ON LINE