

Efeito analgésico do “cruzar os braços”

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

D. M. Torta e cols., das Universidades de Milão e de Turim, Itália, University College, Londres, UK, Instituto de Pesquisa Prince of Wales, Sydney, Austrália, utilizaram voluntários para avaliar a hipótese de que cruzar os braços sobre a linha média do corpo poderia alterar o processamento multimodal eliciado por estímulo nocivo ou tátil. Foram analisadas a intensidade de percepção do estímulo e as alterações do EEG eliciadas por estímulos não nocivos ou nocivos gerados por raios laser aplicados sobre a pele do dorso da mão enquanto os braços eram mantidos descruzados ou cruzados sobre a linha média. A intensidade das sensações evocadas pelos dois tipos de estímulos foi significativamente menor quando os braços foram mantidos cruzados. Autoria do trabalho original: D. M. Torta e cols., Universidades de Milão e de Turim, Itália, University College, Londres, UK, Instituto de Pesquisa Prince of Wales, Sydney, Austrália

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/efeito-analgésico-do-cruzar-os-bracos · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.