

Enxaqueca pode causar lesão no cérebro

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Segundo estudo publicado no Journal of the American Medical Association, crises de enxaqueca com aura (dores e percepção visual de luzes piscando) em mulheres na meia idade podem causar danos cerebrais permanentes. A pesquisadora Lenore J. Launer, do National Institute on Aging, nos EUA, diz que "O grau em que a enxaqueca é um marcador ou fator de risco de mudanças cerebrais que podem ter consequências funcionais na velhice é uma questão importante de saúde pública". Foi realizado um estudo com 2,6 mil mulheres e 2 mil homens, sendo que 10,3% das mulheres e 4,2% dos homens tinham histórico inicial de enxaqueca, com média de idade de 51 anos na primeira avaliação e com 76 anos na última avaliação. Foi detectado que nas mulheres foram mais comuns lesões cerebrais semelhantes a tecidos mortos. Especialistas da Universidade Pierre et Marie Curie, na França, alertam que os resultados devem ser interpretados com cuidado, pois é cedo para concluir que a enxaqueca tem efeitos prejudiciais no cérebro. (IRS) Referência do estudo original: Migraine Headache in Middle Age and Late-Life Brain Infarcts. Ann I. Scher, PhD; Larus S. Gudmundsson, MSc; Sigurdur Sigurdsson, MSc; Anna Ghambaryan, MD; Thor Aspelund, PhD; Guðny Eiríksdóttir, MSc; Mark A. van Buchem, MD, PhD; Vilmundur Gudnason, MD, PhD; Lenore J. Launer, PhD JAMA. 2009;301(24):2563-2570.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/enxaqueca-pode-causar-lesao-no-cerebro · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.