

Estimulação magnética transcraniana repetitiva (EMTr ou TMS) no controle terapêutico da dor talâmica

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo de caso em paciente do sexo feminino que sofreu acidente vascular cerebral - AVE foi realizado com objetivo de relatar um caso de dor talâmica controlada pela técnica de Estimulação Magnética Transcraniana de repetição (EMTr). Além da dor talâmica, a paciente apresentava alodinia e depressão. A paciente foi submetida a 12 sessões num intervalo de 3 semanas e após isso, observou-se a redução significativa da dor e substituíram o analgésico opioide por paracetamol 75 mg, também houve melhora na depressão e a paciente também apresentou melhora motora, deixando a cadeira de rodas e passou a se locomover com auxílio de bengalas e andador. Com os resultados obtidos, os pesquisadores afirmam que a EMTr se apresentou como um importante instrumento terapêutico das sequelas de lesões encefálicas e constitui uma técnica válida para o tratamento das sequelas de AVE e reabilitação física. Referência: Levi Higino Jales Junior, Levi Higino Jales Neto, Patrícia Leda Jales de Brito, Waleska Jessiane S. do N. Freitas, João Paulo M. Ribeiro, Júlia Daniele Tavares Teixeira, Julieli Naiane Tavares Teixeira, Maria do Desterro Leiros Costa. Centro Clínico da Dor - RN. SIMBIDOR - Simpósio Brasileiro e Encontro Internacional Sobre Dor (11º,2013; São Paulo) 11º SIMBIDOR: Arquivos 2013 - (editores) Cibelee Andrucioli de Mattos Pimenta, Geana Paula Kurita, Claudio Fernandes Corrêa - São Paulo - Esfera Editora - 2013.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/estimulacao-magnetica-transcraniana-repetitiva-emtr-ou-tms-no-controle-terapeutico-da-dor-talamica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.