

Estudo da eficácia da combinação dos analgésicos tramadol e acetaminofeno

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A eficácia clínica da combinação dos analgésicos tramadol e acetaminofeno foi analisada em estados de dor aguda e crônica em trabalho publicado por Schnitzer, da Northwestern University Medical School, em Chicago. Em pacientes com dor dental aguda, a combinação dos analgésicos foi mais efetiva no alívio da dor que o uso desses fármacos separadamente. Em pacientes com dor lombar crônica ou osteoartrite, a combinação analgésica teve eficácia equivalente à da associação de codeína e acetaminofeno, entretanto, com menos efeitos colaterais no uso prolongado. Os autores sugerem que a combinação tramadol e acetaminofeno é eficiente porque proporciona analgesia de rápida instalação, característica do acetaminofeno, associada ao prolongado efeito analgésico do tramadol. Nota da redação: O uso de analgésicos associados é amplamente utilizado na clínica para o alívio da dor. Entretanto, as associações de analgésicos em doses fixas têm a desvantagem de não permitirem a alteração da dose de apenas um dos componentes, o que frequentemente é necessário. Referência: Eur J Anaesthesiol. 2003;20 Suppl 28:13-7.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/estudo-da-eficacia-da-combinacao-dos-analgescicos-tramadol-e-acetaminofeno · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.