

Estudo prospectivo mostra relação entre dor e consumo de álcool

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O alcoolismo é uma das patologias que mais afligem indivíduos e coletividades e, pelas suas particularidades e história através dos tempos, é tão antigo quanto o próprio homem. Atualmente a prevalência da dependência de álcool no Brasil é de aproximadamente 12%, sendo muito maior na população com mais de 50 anos. Em vista disso, um estudo prospectivo longitudinal de 3 anos, incluindo 401 indivíduos dependentes ou não de álcool e relacionando a dor ao consumo etílico nos adultos com idade mais avançada, foi recentemente publicado. O consumo de álcool no mês anterior ao estudo foi avaliado pelo método descrito no “Health and Daily Living Form” e a dor foi determinada pelo método descrito no “Medical Outcomes Study”, no qual os pacientes relataram a quantidade de dor que sentiram no mês anterior segundo uma escala de cinco itens que variava desde nenhuma dor até dor muito severa. Os resultados demonstraram que os indivíduos com mais dor usavam maior quantidade de álcool para tratá-la, sendo esta relação mais forte na população com dependência alcoólica, independente do gênero (homens = mulheres). Concluindo, o estudo ressalta a importância de monitoração do consumo de álcool em indivíduos que apresentam dor, especialmente aqueles com dependência do álcool. Referência: Pain and use of alcohol to manage pain: prevalence and 3-year outcomes among older problem and non-problem drinkers. *Addiction*, 100. 777-786.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/estudo-prospectivo-mostra-relacao-entre-dor-e-consumo-de-alcool · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.