

Estudo randomizado, duplo-cego, placebo-controlado do efeito da administração intratecal de ziconotide em adultos com dor crônica severa

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores americanos avaliaram os efeitos analgésicos da administração intratecal de ziconotide (um bloqueador de canais de cálcio do tipo-N) por 3 semanas em 112 pacientes, contra 108 que receberam placebo. Os efeitos adversos também foram monitorados. Observou-se que o grupo de pacientes tratados com ziconotide em doses relativamente baixas apresentou maior satisfação (mensurada pela escala de satisfação CGI – Clinical Global Impression) e tiveram melhor controle da dor, avaliada pela escala analógica visual de intensidade de dor. Os principais efeitos adversos foram náusea e confusão mental. Estes resultados demonstram mais vez o poder da administração intratecal do ziconotide na terapia de dores severas. Referência: (1376-P246) A randomized, double-blind, placebo-controlled study of intrathecal (it) ziconotide in adults with severe chronic pain. Autores e procedência do estudo: M.Wallace¹; E.Ludington²; D.Ellis²; R.Kartzin¹; G.McLellan² - 1. University of California San Diego Medical Center, La Jolla, CA, USA; 2. Elan Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, USA (SPON: Mark Wallace).

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/estudo-randomizado-duplo-cego-placebo-controlado-do-efeito-da-administracao-intratecal-de-ziconotide-em-adultos-com-dor-cronica-severa · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.