

Estudo retrospectivo realizado por pesquisadores da Universidade de Oxford não confirma maior segurança do uso do Valdecoxib como antiinflamatório em termos de menores riscos de efeitos gastrintestinais adversos

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Jayne Edwards e cols., da Universidade de Oxford, no Reino Unido, revisaram 9 estudos randomizados, duplo-cegos, de fases II/III, comparando a eficácia do Valdecoxib (10 ou 20 mg/dia) com placebo e com anti-inflamatórios não-esteroidais (Diclofenaco, Ibuprofeno ou Naproxeno) no tratamento da osteoartrite e artrite reumatoide. Os estudos mostraram que o Valdecoxib, inibidor seletivo da COX-2, foi tão efetivo quanto os anti-inflamatórios não-esteroidais e promoveu menor número de casos de efeitos adversos gastrintestinais. No entanto, as diferenças não foram consideradas como sendo evidências convincentes de que os efeitos colaterais do Valdecoxib são menores do que os dos anti-inflamatórios não-esteroidais.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/estudo-retrospectivo-realizado-por-pesquisadores-da-universidade-de-oxford-nao-confirma-maior-seguranca-do-uso-do-valdecoxib-como-antiinflamatorio-em-termos-de-menores-riscos-de-efeitos-gastrintestina · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.