

Estudo revela conexão entre endometriose, percepção corporal e

depressão O apoio social afeta significativamente pessoas que usam opioides em decorrência de dores prolongadas e desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Pesquisadores de algumas universidades nos Estados Unidos fizeram um

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

depressão O apoio social afeta significativamente pessoas que usam opioides em decorrência de dores prolongadas e desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Pesquisadores de algumas universidades nos Estados Unidos fizeram um estudo de Coorte, onde foi analisado se a dor seria menor em pacientes que tinham apoio social quando comparados a pacientes que não tinham. O estudo destaca que pessoas que não têm apoio social e são acometidas por dores crônicas são mais passíveis de usarem mais opioides e, em decorrência disso, desenvolverem TEPT. Quando comparado com pessoas que têm apoio social é visto que essas pessoas com apoio social sentem menos dores e, por consequência, usam menos opioides. A pesquisa foi realizada com início em novembro de 2019 e terminou em novembro de 2023, 852 participantes concluíram a pesquisa e 808 foram elegíveis para o estudo. A pesquisa seguiu o modelo de estudo de coorte prospectivo com avaliações de acordo com as linhas de bases. Os pacientes foram recrutados a partir de 2 sistemas de saúde, todos tinham acima de 18 anos e não poderiam ter nenhuma dor relacionada ao câncer, dentre todos os pacientes foi analisado que 17,2% tinham provável TEPT. O TEPT foi significativamente associado a um maior uso de opioides e pessoas com mais

locais de dor e que consumiam mais opioides foram associados com um menor aporte emocional. Referência: Sullivan MD, Wilson L, Amick M, et al. Social support and the association between post-traumatic stress disorder and risk for long-term prescription opioid use. Pain. 2024;165(10):2379-2386. doi:10.1097/j.pain.0000000000003286 Escrito por Luana Júlia Faria Gonçalves.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/estudo-revela-conexao-entre-endometriose-percepcao-corporal-e-2 · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE