

Etoricoxib no alívio da dor pós-cirúrgica dental

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A Merck & Co, Inc. está estudando os efeitos do Etoricoxib (MK-663), um anti-inflamatório não-esteroidal que parece inibir especificamente a COX-2. A COX-2, conforme descrito na literatura, é uma enzima induzida durante um processo inflamatório e que não participa da produção de prostaglandinas nos processos fisiológicos, e por isso, anti-inflamatórios com ação específica apresentariam menos efeitos colaterais. O estudo da Merck avaliou 398 pacientes que foram submetidos à extração de, pelo menos, dois dos terceiros molares. Os pacientes receberam aleatoriamente dose única de placebo (controle), etoricoxib (60, 120 ou 180 mg) ou ibuprofen (400 mg). O etoricoxib produziu alívio da dor nos pacientes, quando comparado ao grupo controle. O início do efeito ocorreu em 30 minutos e durou até 12 horas para a dose de 60 mg. O grau de analgesia foi semelhante ao obtido pelo ibuprofen, com frequência dos efeitos colaterais reduzida.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/etoricoxib-no-alivio-da-dor-pos-cirurgica-dental · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.