

Fator genético pode estar associado à dor crônica após lesão cerebral traumática

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

A lesão cerebral traumática leve pode levar a dor crônica. Sobre essa teoria foi erguido um estudo com o intuito de avaliar se fatores que se manifestam na fase aguda (em 6 semanas) são fatores que podem influenciar na gênese da dor crônica (após 1 ano). Para realização do mesmo foram utilizados 94 pacientes que foram submetidos a uma série de testes. Como principal resultado, foi constatado que um polimorfismo do gene BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) pode estar associado com a geração de dor crônica posterior à lesão cerebral traumática. Referência: S. Khoury, A. Noreau, D. Bouthillier, J. Giguère, R. Denis, G. A. Rouleau, G. J. Lavigne. A Functional Bdnf Polymorphism predicts Chronic Pain Following Mild Traumatic Brain Injury. Poster number: [PW365]. 15 WCP, Buenos Aires, Outubro de 2014.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/fator-genetico-pode-estar-associado-a-dor-cronica-apos-lesao-cerebral-traumatica · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.