

## FDA autoriza medicamento para prevenção de enxaqueca em adolescentes

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos aprovou o medicamento Topamax® (topiramato) para a prevenção de enxaquecas em adolescentes. A tolerabilidade e a eficácia do Topamax® na prevenção das enxaquecas em adolescentes de 12 a 17 anos foram estabelecidas em um estudo clínico que incluiu 103 participantes. Os tratados com o Topamax® apresentaram uma diminuição da frequência de enxaquecas de aproximadamente 72% em comparação com 44% dos participantes que tomaram um composto inativo (placebo). O Topamax® foi aprovado inicialmente pela FDA, em 1996, com finalidade anticonvulsivante. Além disso, em 2004, seu uso foi autorizado para a prevenção da enxaqueca em adultos. Há relatos que o medicamento tem sido usado para emagrecer, principalmente por causa da proibição da venda de emagrecedores à base de anfetaminas e a restrição à venda de sibutramina pela ANVISA no Brasil. No entanto, vários efeitos colaterais são relatados, entre eles, adormecimento e formigamento em várias partes do corpo, problemas de memória, dificuldades de concentração, infecção das vias respiratórias superiores, anorexia (perda do apetite) e depressão. O risco do nascimento de bebês com lábio leporino ou fenda palatina é ainda maior em mulheres que tomam o Topamax® durante a gravidez. Referência e fonte: Fallah R, Akhavan Karbasi S, Shajari A, Fromandi M. The efficacy and safety of topiramate for prophylaxis of migraine in children. Iran J Child Neurol. 2013 7(4):7-11. <http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2014/01/1397775-remedio-para->

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/fda-autoriza-medicamento-para-prevencao-de-enxaqueca-em-adolescentes](http://novo.dol.inf.br/materia/fda-autoriza-medicamento-para-prevencao-de-enxaqueca-em-adolescentes) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE