

Fentanil transdérmico é eficaz no tratamento da dor crônica em pacientes com Aids

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo realizado por pesquisadores norte-americanos mostrou que o fentanil transdérmico é eficaz no controle da dor crônica relacionada a Aids, com efeitos adversos moderados. O estudo feito com 35 pacientes ambulatoriais com Aids indicou alívio da dor, melhora nas atividades gerais como humor, relacionamentos, trabalho e prazer de viver, quando a morfina (45 mg/dia) foi substituída pelo fentanil transdérmico (Journal of Pain and Symptom Management, 21, 69-77, 2001). Nota da redação: Entretanto, a utilização de opioides no tratamento da dor, deve ter indicações bem específicas, principalmente no que tange a dor crônica de caráter benigno. A real possibilidade de dependência no uso destas drogas deve ser considerada. A determinação da etiologia e correta classificação do tipo de dor são fundamentais para a instituição de terapêutica adequada. A melhora da dor com o uso de opioides pode ter conotação real ou decorrer da sensação de bem estar que o tratamento proporciona, sendo na maioria dos casos injustificado o seu uso. A dependência com o uso destes é fato real e jamais deve ser negligenciado.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/fentanil-transdermico-e-eficaz-no-tratamento-da-dor-cronica-em-pacientes-com-aids · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.