

Hemicrania Contínua

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Cefaleias unilaterais podem apresentar sinais e sintomas similares aos de patologias dentárias e são um desafio diagnóstico para dentistas. O grupo do professor Yair Sharav, de Israel, apresentou uma revisão das cefaleias unilaterais, especialmente a Hemicrania Contínua. Foram revisados os diversos aspectos desse tipo de cefaleia como a fisiopatologia, fenômenos acompanhantes, localização, tratamento e diagnóstico diferencial. Segundo os autores, este último deve levar em consideração a cefaleia em salvas, a hemicrania paroxística, cefaleia cervicogênica e as dores orofaciais e dentais. Além de revisar 39 casos de hemicrania contínua descritos na literatura, eles também relataram o caso onde uma paciente do sexo feminino, 30 anos de idade, apresentava queixa de dor unilateral na face e cabeça. A dor também era sentida na região de primeiro e segundo molares superiores do lado afetado. O diagnóstico final foi de Hemicrania Contínua. Esse tipo de cefaleia é relativamente fácil de tratar uma vez que é responsiva à indometacina, fato que, inclusive, é usado para o diagnóstico. Os resultados são bons e o alívio da dor ocorre de maneira rápida. Referência: Journal of Orofacial Pain 2002;16: 317-325

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/hemicrania-continua · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.