

Hérnia inguinal em homens causa dor durante relação sexual e cirurgia

de remoção é eficaz na redução dessa dor Estudo sugere elevada prevalência de dor durante relações sexuais em homens com hérnia inguinal e aponta que a remoção cirúrgica da hérnia, independentemente do método cirúrgico, produz alívio dessa

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

de remoção é eficaz na redução dessa dor Estudo sugere elevada prevalência de dor durante relações sexuais em homens com hérnia inguinal e aponta que a remoção cirúrgica da hérnia, independentemente do método cirúrgico, produz alívio dessa dor. Pesquisadores da

Suécia realizaram um estudo com pacientes do Hospital Universitário da Universidade de Lund para avaliar a ocorrência de dor durante a atividade sexual em pacientes com hérnia inguinal e comparar os impactos da cirurgia de remoção da hérnia pelo método de TEP e método de Lichtenstein sobre essa dor após a cirurgia. Um total de 304 homens entre 30-60 anos com indicação para realização de cirurgias para remoção de hérnia primária pelo método de TEP (técnica laparoscópica) ou Lichtenstein (técnica aberta convencional), foram inseridos no estudo. Foram aplicados questionários sobre disfunção sexual, qualidade de vida, prevalência de dor, comprometimento da função sexual devido à dor e frequência da dor, antes, 1 e 3 anos após a cirurgia. A intensidade da dor foi avaliada pela escala visual analógica (VAS). Os resultados mostraram que, no período pré-operatório, 35% dos participantes tinham dor durante relação sexual e reduzida qualidade de vida. O reparo cirúrgico reduziu acentuadamente a dor durante a

atividade sexual e restaurou a qualidade de vida na maioria dos pacientes, sem diferença entre as técnicas cirúrgicas utilizadas. O estudo concluiu que a dor na atividade sexual em homens com hérnia inguinal é mais comum do que se suspeita e reduz a qualidade de vida. O reparo cirúrgico da hérnia é eficaz na redução da dor. Os autores alertam que os pacientes devem ser informados sobre uma relação potencial entre ter uma hérnia inguinal e deficiência sexual. Referência: Gutlic A, Rogmark P, Gutlic N, Petersson U, Montgomery A. Pain with sexual activity at 1 and 3 years: Comparing total extraperitoneal with Lichtenstein inguinal hernia repair in a randomized setting (TEPLICH trial). Surgery. 2022 Nov;172(5):1463-1470. doi: 10.1016/j.surg.2022.07.013. Epub 2022 Aug 27. PMID: 36038370. Alerta submetido em 12/12/2022 e aceito em 12/12/2022. Escrito por Alyne Almeida de Lima.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/hernia-inguinal-em-homens-causa-dor-durante-relacao-sexual-e-cirurgia · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.