

Indivíduos que referem dor entre 4 a 7 locais têm até 74% de chance de

adquirir infecção por COVID - 19 comparado com indivíduos que não apresentam dor crônica. Assim, podemos concluir que a dor crônica tanto local quanto generalizada quando associada ao COVID-19 aumenta a chance de hospitalização. Referência:

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

adquirir infecção por COVID - 19 comparado com indivíduos que não apresentam dor crônica. Assim, podemos concluir que a dor crônica tanto local quanto generalizada quando associada ao COVID-19 aumenta a chance de hospitalização. Referência: Hastie CE, Foster HME, Jani BD, O'Donnell CA, Ho FK, Pell JP, Sattar N, Katikireddi SV, Mair FS, Nicholl BI. Chronic pain and COVID-19 hospitalisation and mortality: a UK Biobank cohort study. Pain. 2023 Jan 1;164(1):84-90. doi:

10.1097/j.pain.0000000000002663. Epub 2022 Apr 22. PMID: 35452027; PMCID: PMC9756431. Alerta submetido em 13/01/2023 e aceito em 13/01/2023. Escrito por Elizabete Cristina de Lira Santiago.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/indivíduos-que-referem-dor-entre-4-a-7-locais-tem-ate-74-de-chance-de · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.