

Infiltração de bupivacaína reduz a dor pós-operatória e a necessidade do uso de opióides na cirurgia da tireóide

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Pesquisadores do Hospital Universitário Hadassah, em Jerusalém (Israel), demonstraram que a infiltração de 10 ml de bupivacaína a 0,5% diminui a dor pós-operatória e a necessidade do uso de opióides na cirurgia da tireoide. No estudo, quarenta pacientes indicados para tireoidectomia foram divididos aleatoriamente em dois grupos: o grupo 1, que recebeu infiltração de bupivacaína a 0.5% após a cirurgia, e o grupo 2, que foi usado como controle. Os pacientes foram ouvidos 24 horas após a cirurgia, sendo questionados sobre a intensidade de dor apresentada, e os dados obtidos dos dois grupos foram analisados. Os pacientes do grupo 1 apresentaram menor índice de dor em relação ao grupo 2 (controle) e somente 30% do grupo 1 necessitou de tratamento com opióides, enquanto que, no grupo 2, essa necessidade ocorreu em 90% dos pacientes.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/infiltracao-de-bupivacaina-reduz-a-dor-pos-operatoria-e-a-necessidade-do-uso-de-opioides-na-cirurgia-da-tireoide · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.