

## **Inflamação aguda não contribui para o desenvolvimento da síndrome de dor regional**

*complexa Foram recrutados 13 participantes que preencheram os critérios de CRPS de Budapeste e outros 60 preencheram os critérios da IASP para CRPS. Nas análises primária e secundária não houve associações estatisticamente significativas e*

---

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

---

complexa

Foram recrutados 13 participantes que preencheram os critérios de CRPS de Budapeste e outros 60 preencheram os critérios da IASP para CRPS. Nas análises primária e secundária não houve associações estatisticamente significativas entre a expressão de qualquer citocina eo risco de CRPS.

Quando comparados ao grupo controle, os indivíduos com CRPS apresentaram uma maior dor intensa, depressão, ansiedade e estresse e estavam mais suscetíveis a uma fratura intra-articular. Com isso, o grupo rejeita a hipótese de que a inflamação aguda desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de CRPS após fratura aguda de membro superior.

Referência: L. Parkitny, ). McAuley, R. Herbert, F. Di Pietro, P. Kelly, L. Moseley. Acute Inflammation Does Not Contribute To The Development Of Complex Regional Pain Syndrome. Poster session presented at: 16th World Congress on Pain. 30/09/2016. Yokohama. Japan.

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/inflamacao-aguda-nao-contribui-para-o-desenvolvimento-da-sindrome-de-dor-regional](http://novo.dol.inf.br/materia/inflamacao-aguda-nao-contribui-para-o-desenvolvimento-da-sindrome-de-dor-regional) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.