

Insuficiência cardíaca: possível efeito colateral de antagonistas de TNF α

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Antagonistas de TNF α são atualmente utilizados para o tratamento da artrite reumatoide, artrite juvenil e doença de Crohn (patologia inflamatória crônica de causa desconhecida que afeta qualquer parte do tubo digestivo). Recentemente, Kwon e cols. relataram possíveis efeitos colaterais associados ao uso desses fármacos. Pacientes tratados com etanercept (receptor solúvel de TNF α) e infliximab (anticorpo contra TNF α) foram analisados. Após a terapia, 38 pacientes, de um total de 47, desenvolveram insuficiência cardíaca e 9 agravaram insuficiência já existente. Entre os 38, 19 (50%) não tinham fatores de risco e 10 tinham menos de 50 anos. Os autores concluíram que em uma parcela de pacientes a terapia com antagonistas de TNF α pode induzir ou exacerbar insuficiência cardíaca. (CFV) Veja mais sobre antagonistas de TNF α no Baú do DOL Referência: Ann. Intern. Med. 138: 807-811, 2003.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/insuficiencia-cardiaca-possivel-efeito-colateral-de-antagonistas-de-tnfa · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.