

Intervenção farmacológica no controle da dor

Relato de caso brasileiro apresentado por pesquisadores das universidades federais de Goiás e São Paulo demonstra efeito benéfico do uso do analgésico Tapentadol de liberação prolongada para o tratamento de pacientes com dores crônicas inte

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Relato de caso brasileiro apresentado por pesquisadores das universidades federais de Goiás e São Paulo demonstra efeito benéfico do uso do analgésico Tapentadol de liberação prolongada para o tratamento de pacientes com dores crônicas intensas devido à osteoartrite. Não foram apresentados efeitos adversos de grande significância e sem a efetividade no controle da dor, associado também a tratamentos não farmacológicos. Foram selecionadas três pacientes do sexo feminino com idades de 49, 75 e 86 anos para a descrição da intervenção, mediante o fato de que a população feminina convive com alterações dos seus processos hormonais ao avançar da idade, sendo comum o desgaste ósseo, associado ao envelhecimento. Ambas as participantes apresentavam dores intensas antes do início da terapia medicamentosa. E o manejo terapêutico foi individualizado conforme a intensidade verificada pelos escores dos questionários de dor neuropática e da escala analógica visual. Sendo que após a utilização do fármaco as pacientes relataram a mudança do perfil das dores, de intensa para leve. Tendo sido realizado a redução gradual do medicamento, optou-se pela manutenção de 100 mg a cada 12 horas para as pacientes pela eficácia analgésica sem efeitos adversos significativos, a não ser enjôo nos dois primeiros dias de uso

por uma das pacientes. Diante disso conclui-se que a utilização do Tapentadol possa ser uma opção futura para o tratamento de dor crônica em pacientes com osteoartrite, mas devendo antes ser analisado em uma amostra maior e que abarque ambos os sexos feminino e masculino, em amplas faixas etárias. Sendo essa intervenção associada também a outras terapias que propiciam o melhor manejo da dor, como a fisioterapia e reabilitação contínuas. Referência Bibliográfica: Moraes FB de, Liggieri AC, Sadigursky D. Tapentadol extended-release as a therapeutic strategy for pain control in cases of osteoarthritis. Case reports. BrJP. 2023;6(3):330-333. doi:10.5935/2595-0118.20230068-em Alerta submetido em 03/11/2023 e aceito em 05/12/2023. Escrito por Ana Luiza Martins Costa dos Santos.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/intervencao-farmacologica-no-controle-da-dor · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.