

Lacosamide reduz dor causada por artrite reumatóide

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Estudo recente realizado em conjunto por pesquisadores da Alemanha e da França mostrou que o lacosamide, um medicamento que tem se mostrado eficaz em diminuir a dor experimental em modelos animais de dor inflamatória e dor neuropática diabética, e capaz de diminuir a dor neuropática em humanos, também diminui a dor em animais com artrite de modo comparável à morfina ou diclofenaco. Os resultados sugerem que o lacosamide age por meio de vários mecanismos para diminuir a dor nos animais. Nota da redação: Um fato interessante com relação à esta pesquisa é que mostrou que o lacosamide tem efeito analgésico potente durante as crises dolorosas com a artrite já instalada, do mesmo modo que medicamentos como a dipirona ou a morfina. Porém, para que se torne um medicamento passível de ser utilizado na clínica médica, estudos que mostrem sua eficácia durante o uso crônico e/ou anteriormente ao desenvolvimento da artrite para se avaliar, além da possibilidade de causar efeitos adversos, sua capacidade preventiva de doenças osteoartríticas, são necessários. Autores e procedência do estudo: Bettina Beyreuther (1), Noëlle Callizot (2), Thomas Stöhr (1) - (1) Schwarz BioSciences GmbH, Dept. Pharmacology/Toxicology, Germany; (2) Neurofit Parc d'Innovation, France; Referência: Antinociceptive efficacy of lacosamide in the monosodium iodoacetate rat model for osteoarthritis pain. Arthritis Research & Therapy 2007, 9:R14 doi:10.1186/ar2121.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/lacosamide-reduz-dor-causada-por-artrite-reumatoide · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.