

## Mastectomia e dor da mama fantasma

---

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

---

Um estudo da instituição Johns Hopkins sugeriu que a mastectomia pode originar dor semelhante à dor do membro fantasma. A pesquisa se baseou em relatos de 279 mulheres submetidas à referida cirurgia. Deste grupo, 48% das pacientes foram submetidas à cirurgia reconstrutiva da mama. Do total de mulheres, cerca de 40 % relatou dor na mama ausente e 50% relatou sensações como coceira, incômodo, agulhadas e pressão. A dor e os sintomas duraram em média 20 meses. Os autores compararam esta dor da mama fantasma à dor que aparece após amputações, onde a secção de fibras nervosas pode ocasionar dor de origem neuropática, bastante descrita na literatura. Nota da Redação: A dor do membro fantasma caracteriza-se por sensação dolorosa em um membro ou parte do corpo submetida à amputação. Tem difícil tratamento e frequentemente não há registro de melhora ao longo do tempo. O fato da dor da mama fantasma ter desaparecido após um certo período pode não caracterizá-la como dor do membro fantasma, mas sim como uma sensibilização da região decorrente do processo cirúrgico.

---

Fonte: [novo.dol.inf.br/materia/mastectomia-e-dor-da-mama-fantasma](http://novo.dol.inf.br/materia/mastectomia-e-dor-da-mama-fantasma) · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.