

Medicamento para baixar os níveis de colesterol

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

O FDA (Food and Drug Administration) informa ao público que o uso de sinvastatina (medicação usada para baixar o colesterol) em dose elevada (80mg) causa lesão muscular. O efeito foi comparado com pacientes que tomam as doses mais baixas e outros medicamentos da classe das estatinas. Uma pesquisa analisou a redução nos níveis de colesterol e de homocisteína ao longo de 6,7 anos em pacientes que tiveram ataque cardíaco. O acompanhamento de 6.031 pacientes que tomam 80mg de sinvastatina comparado com 6.033 pacientes que tomam 20mg de sinvastatina levou a observação de que o grupo com a maior dose do medicamento desenvolveu miopatia (lesão muscular) com sintomas de dor muscular, sensibilidade, fraqueza e elevação de enzimas musculares no sangue. Quando são utilizadas doses superiores de sinvastatina junto com um medicamento antiarritmico (amiodarona) há risco de degradação do músculo esquelético (rabdomiólise), que é a forma mais grave de miopatia, podendo, além de lesão muscular, levar ao desenvolvimento de insuficiência renal. Os fatores de risco para desenvolver rabdomiólise são idade, hipotireoidismo e insuficiência renal. No entanto, a rabdomiólise é um evento raro de sintomas adversos relatados com todas as estatinas. Fonte: FDA Drug Safety Communication: Ongoing safety review of high-dose Zocor (simvastatin) and increased risk of muscle injury, Boletim FDA 19/3/2010

<http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProv>

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/medicamento-para-baixar-os-niveis-de-colesterol · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line.
Reprodução permitida mediante citação da fonte.