

Medo e preconceito na aceitação de morfina por pacientes com câncer - a prescrição desse medicamento normalmente é relacionada à falta de tratamentos eficazes e morte próxima

DOL — Dor On Line · Boletim Científico sobre Dor · ISSN 2446-6670

Um estudo que entrevistou pacientes com câncer mostrou que o maior problema para a aceitação do tratamento com drogas opíoides (do tipo da morfina) não é a possibilidade de efeitos adversos e dependência, mas, sim, a ideia preconcebida de que estes analgésicos são utilizados apenas para conforto de pacientes em fase terminal da doença. Muitos pacientes acreditam que os opíoides, principalmente a morfina, sejam utilizados apenas como último recurso, quando nada mais funcionou, e, por isso, associam este tratamento à morte. Cabe ao profissional da saúde esclarecer os pacientes quanto à eficácia e segurança do uso desses medicamentos, que ainda é um dos melhores tratamentos no caso da dor causada pelo câncer. Além de aumentar a aceitação do tratamento, a informação adequada dos pacientes vai diminuir a angústia destes em relação à sua doença, especialmente em casos de câncer, uma doença que já traz por si uma carga de reações e expectativas muito negativas nos pacientes, mesmo com recente melhora no tratamento e possibilidade de cura. Referência do estudo original: Reid CM, Gooberman-Hill R, Hanks GW. Opioid analgesics for cancer pain: symptom control for the living or comfort for the dying? A qualitative study to investigate the factors influencing the decision to accept morphine for pain caused by cancer. Ann Oncol. 2008 Jan;19(1):44-8.

Fonte: novo.dol.inf.br/materia/medo-e-preconceito-na-aceitacao-de-morfina-por-pacientes-com-cancer-a-prescricao-desse-medicamento-normalmente-e-relacionada-a-falta-de-tratamentos-eficazes-e-morte-proxima · Conteúdo do Boletim DOL — Dor On Line. Reprodução permitida mediante citação da fonte.

DOL - DOR ON LINE